



APISBLOOM

**‘n Bestuiwingsversterker wat ‘n beheerde
hoeveelheid heuningbylokmiddel vrystel om
bybestuiwingsaktiwiteit te bevorder.**

Wat is APIS BLOOM?


APIS BLOOM gebruik 'n eie mengsel van terpenoïede om die proses na te boots wat bye gebruik om hoëwaarde nektar- of stuifmeelbronne te merk, en sodoende bybestuivingsaktiwiteit te verhoog. Die produk gebruik die gespesialiseerde SPLAT (Specialized Pheromone & Lure Application Technology) formulering en word as 'n pienk wasagtige pasta regdeur die gewasarea toegedien. Die eko-vriendelike, reënvastige en stadigvrystellende wasformulering lei tot langlewendheid in die veld, wat verseker dat minder toedienings van die aantrekklike feromoon nodig is om verbeterde bestuiving te bewerkstellig. Die gelyke verspreiding van bye aantrekklike feromoon in boorde maak voorsiening vir verhoogde tydsduur, egaligheid in byevoeding en lewering van bestuivingsdienste.



Hoe Werk APIS BLOOM?

Sommige gewasse is nie so aantreklik vir bye nie en dus sal bye dikwels wilde plante en blomme bestuif in plaas van die teikengewas. Dit kan lei tot ondoeltreffendheid in die lewering van bestuivingsdienste. APIS BLOOM word as blertse in die boord toegedien en verbeter bestuiving deur 'n beheerde-vrystelling heuningbylokmiddel—dieselfde feromoon wat werkerbye vrylaat wanneer 'n ryk nektarbron ontdek word. Hierdie lokmiddel stel heuningbye effektief in kennis en konsentreer dit in die geteikende gewasarea, wat kommunikasie en werwing van ander bye stimuleer wanneer hulle met stuifmeel of nektar na die korf terugkeer. Deur bykomende werkerbye na jou bloeiseis te lok, verhoog APIS BLOOM bestuivingsyfers terwyl dit ook bye aanmoedig om vir langer tydperke en groter afstande binne jou boorde af te lê.

Standaard bestuivingspraktyke skep 'n ongelyke verspreiding van heuningbye regdeur die veld.



APIS BLOOM veroorsaak 'n eenvormige en deeglike verspreiding van bestuivingsaktiwiteit deur heuningbye.



APIS BLOOM Voordele:



Verhoogde Byekorf Aktiwiteit

Heuningbye sal hul korwe vroeër verlaat en later uitbly. Die verhoogde aktiwiteit kan hoër vlakke van bestuiving en verbeterde vrugset tot gevolg hê.



Omgewingsvriendelik

APIS BLOOM gebruik 'n feromoonverbinding wat in die natuur voorkom en benadeel nie voordelige insekte nie.



Langlewendheid

Feromone sal tot 3-4 weke vrystel word na die toediening van APIS BLOOM.




MRL Bestuur

Geen chemiese residue of MRL's

APIS BLOOM Doeltreffendheid en Proefdata:

Die onderstaande doeltreffendheidsdata is gebaseer op proewe wat in Kiwi-boorde uitgevoer is.


Bye Aktiwiteit



'n **Beduidende toename** in **by-aktiwiteit** by die korwe in **APIS BLOOM behandelde gebiede**. By-aktiwiteit is gemeet deur die aantal bye wat uit die korf kom en gaan, te tel.


Oor die algemeen dui die data op 'n **47% toename in by-aktiwiteit** in APIS BLOOM behandelde boorde.

Bye Stuifmeel Gewigte



'n **Toename van 61,2%** in die hoeveelheid **stuifmeel** wat deur bye in APIS BLOOM-behandelde gebiede versamel is.

Vrugset Data



Aantal vrugte per wingerdstok het met 14% toegeneem in APIS BLOOM-behandelde gebiede relatief tot onbehandelde gebiede.



River Bioscience (Pty) Ltd.
admin@riverbio.com
5th Floor, Fairview House,
Fairview Office Building, 66 Ring Road
Greenacres, PE, 6045
PO Box 20388, Humewood, 6013

APIS BLOOM™
River Bioscience (Pty) Ltd.

Aktiewe Bestanddeel:
Heuningby Lokmiddel Feromone

